

ต้นแซะ

*Callerya atropurpurea* (Wall.) Schot

Fabaceae



ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. ในประกอบปลายคี่ เรียกวีน แกนในประกอบยาว 10–22 ซม. โคนก้านพองใบย่อยมี 3–5 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ เบี้ยวเล็กน้อย เส้นกลางใบบุบส่องด้าน ก้านใบย่อยยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 10–20 ซม. ก้านช่อหนา ในประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็กใบประดับย่อยติดกัน กลีบเลี้ยงรูปประจำ เบี้ยว ยาวประมาณ 5 มม. ปลายแยกเป็นแฉกขนาดเล็กไม่เท่ากัน มีขนเป็นมันวาวทั้งสองด้าน ดอกสีชมพูถึงม่วงเข้ม ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบกลางรูปรีกว้าง ยาว 1–1.5 ซม. กลีบคู่ล่างกว้าง ยาว 1–1.4 ซม. เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 อัน อีกกลุ่มหนึ่งมี 1 อัน ยาวไม่เท่ากัน ยาว 0.7–1.2 ซม. ก้านเกสรเพศเมียโค้ง ผลรูปรีหรือรูปไข่กลับ แบน ยาว 7.5–15 ซม. ผนังผลหนา มี 1–2 เมล็ด แบน ๆ ยาว 3–4 ซม.

พบในพม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทร猛烈 และสูมาตรา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร راكใช้เป็นปุ๋ย

สกุล *Callerya* Endl. ในปัจจุบันได้รวมเอาสกุล *Adinobotrys*, *Padbruggea*, *Whitfordiodendron* และบาง section ของสกุล *Millettia* เข้าไว้ด้วย ตามลักษณะช่อดอกที่เป็นแบบช่อแยกแขนงก้านช่อหนา ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน 2 กลุ่ม มีใบประดับชัดเจน กลีบเลี้ยงสมมาตรด้านข้าง มีประมาณ 19 ชนิด ส่วนมากเป็นไม้เลื้อย พบในประเทศไทยและทวีปเอเชีย จีน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ถึงออสเตรเลีย ในไทยมีประมาณ 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “*kallaion*” แ朋คอไก่ ตามลักษณะช่อดอก

ชื่อพ้อง *Millettia atropurpurea* (Wall.) Benth.

ชื่อสามัญ Purple Millettia

ชื่ออื่น กากแซะ, แซะ (ภาคใต้); พุงหมู (อุบลราชธานี); ยืนเงะ (มาเลย์-นราธิวาส)

