

ต้นเหยื่อเลี้ยงผา/เหยื่อจิง

*Impatiens kerriae* Craib

Balsaminaceae



ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ แตกกิ่งหนาแน่น สูงได้ถึง 1 ม. ใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายยอด รูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 6–11 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปปลีหรือรูปปลีมักว้าง แผ่นใบหนา ขอบจักฟันเลื่อย ปลายมีต่อม โคนใบมีต่อม 1 คู่ ก้านใบยาว 1–3 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ใบประดับรูปแถบ ยาวประมาณ 5 มม. ก้านดอกยาว 4–10 ซม. ดอกสีเหลืองอ่อน สีครีม หรืออมชมพู โคนด้านในกลีบล่างมีปื้นเป็นริ้วสีเหลืองหรือแดง กลีบเลี้ยงคู่นอกรูปไข่กว้าง ยาว 1.5–2 ซม. ปลายมีติ่งแหลม คู่ในฝ่อ กลีบปากเป็นถุงกว้าง กว้าง 2–2.5 ซม. เตือรูปตะขอ ยาวประมาณ 5 มม. แยก 2 พู กลีบกลางรูปรีแกมรูปไข่กลับ ยาว 1.5–2 ซม. ปลายเว้าตื้น กลีบปีกคู่นอกและคู่ในยาวเท่า ๆ กัน ยาวได้ถึง 3.5 ซม. ผลรูป กระจวย เต่งกลาง ยาวได้ถึง 3 ซม. เมล็ดมีขนละเอียด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทียน, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว และดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามที่โล่งเขาหินปูน ความสูง 1300–2200 เมตร

ชื่ออื่น เทียนนางคาร์, เทียนหมอคาร์ (ทั่วไป); เหยื่อจิง, เหยื่อเลี้ยงผา (Chiang Mai)

