

ต้นเลือดคราวย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Knema furfuracea* (Hook. f. & Thomson) Warb

จัดอยู่ในวงศ์จันทน์เทศ (MYRISTICACEAE)



สมุนไพรเลือดคราวยเป็นใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า จันทร์ดง (ยะลา), เลือดคราวย (ตรัง), สถานแแดง แปง (มลายู-นราธิวาส), ลำเลือด (ลั้วะ), ตุ๊ดไลมา (ขมุ), ด่างฉาง (มัง), เดียงหยาม (ไม้ย่าง แดง) (เมียน) ส่วนชาวนครศรีธรรมราชเรียก "เลือดคราวยเป็นใหญ่"

ลักษณะของเลือดคราวยเป็นใหญ่

ต้นเลือดคราวยเป็นใหญ่ จัดเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงของต้นประมาณ 20 เมตร หรือมากกว่า เรือดยอด เป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม กิ่งก้านขนาดกับพื้นดิน ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาล มี芽angสีแดง เปลือกต้นเป็นสี น้ำตาลแดง แตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว เปลือกชั้นในเป็นสีส้ม โคนต้นมีรากค้ำยันสูงประมาณ 1-2 เมตร รอบโคนต้นมีรายละเอียดลักษณะคล้ายกับบงครีงวงกลมโผล่ขึ้นทั่วไป พับเฉพาะในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศพบได้ที่ประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย

สรรพคุณของเลือดคราวยเป็นใหญ่

ใบใช้เป็นยารักษาสิว (ใบ)

ประโยชน์ของเลือดคราวยเป็นใหญ่

เนื้อไม้นิยมนำมาใช้สำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทำคอกหมู หรือใช้ทำหน้าไม้ ลำต้นและกิ่งใช้สำหรับทำฟืน

