

ต้น hairy

วงศ์: Arecaceae



hairy เป็นพืชที่อยู่ในเผ่า hairy (Calameae) 属ที่มาในเขตต้อนของทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอสตราเลเซีย ทั่วโลกมี hairy กว่า 600 ชนิด เนพาะในประเทศไทย มี hairy กว่า 60 ชนิด เช่น hairy โคง hairy ดง hairy น้ำผึ้ง เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไปของ hairy เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยหรือไม้ร้อเลื้อยตระกูลปาล์ม ลำเดาซอบพันเกะตันไม้ใหญ่ มีกาบหุ้มต้น และมีหนามแหลม มีความเหนียว ใบเป็นรูปขนนกเล็กๆ ใบย่อยนั้นเรียวยาว มีสีเขียวสด ก้านใบหนึ่งๆ มีใบย่อยร้า 60 - 80 คู่ ออกดอกเป็นช่อ สีขาวปนเหลือง ผลค่อนข้างกลม เปลือกเป็นเกล็ด ลูกอ่อนเปลือกสีเขียว เนื้อสีขาว ผลแก่เปลือกสีเหลือง เปลือกกล่อน เนื้อแข็ง รสเปรี้ยวอมเผ็ด

การใช้ประโยชน์

hairy เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในจังหวัดสกลนครและขอนแก่น มีการปลูก hairy เชิงการค้า นิยมนำส่วนลำต้นที่สูงและมีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษมาสานเป็นตะกร้า เครื่องเรือน ลูก hairy อ่อนใช้กินเป็นผักจิ้มน้ำพริก แกะเปลือกออกแล้วนำไปทำส้มตำ หน่อ hairy ใช้ทำอาหาร เช่น แกงอ้อม ซุบหน่อ hairy ยำ ข้าวเกรียบและ hairy ทอดกรอบ hairy บางชนิดในผลมีเรซินสีแดงเรียกเลือดมังกร ซึ่งใช้เป็นยาในสมัยโบราณและใช้ย้อมสีไวโอลิน ในรากอัสสัม ประเทศอินเดีย ใช้หน่อ hairy เป็นอาหารเช่นกัน

